DLP 30-10-891512313 N 0751-154 X R Vertissement agricoles (

Bulletin technique n° 29 du 25 octobre 1989

Abonnement Annuel: 190 F

* CEREALES A PAILLE :

Surveillez les infestations de pucerons vecteurs de la Jaunisse Nanisante de l'Orge

* COLZA :

Premières captures du Charançon du bourgeon terminal

** CEREALES A PAILLE **

-JANISSE NANISANTE DE L'ORGE

* SITUATION:

Les orges sont, pour les plus précoces, parvenus au stade 2 à 3 feuilles. Les semis précoces de blé du Haut-Rhin sont au stade 2 feuilles. Les cultures deviennent attractives pour les pucerons. Le risque d'infestation est élevé : les pucerons sont présents sur les repousses de céréales et les graminées sauvages. De plus, la Tour à succion de Colmar enregistre un vol important de Rhopalosiphum padi depuis plusieurs semaines.

Des repousses de céréales et des vulpins colonisés par R. padi, prélevés dans le Kochersberg le 18 octobre, étaient contaminés par le virus de J.N.O.. Le risque de contamination des céréales d'hiver par la J.N.O. est élevé cette année.

* PRECONISATION:

Il est fortement conseillé d'évaluer les populations de pucerons dès que la céréale est entièrement levée. Un traitement est préférable au stade "2 feuilles" dès que 10 à 20 % des plantes sont habitées par les pucerons (comptage sur 10 fois 10 plantes).

Imprimerie de la Station de STRASBOURG Directeur-Gérant : P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE D. R. A. F. Service Régional de la Protection des Végétaux

Cité Administrative 67084 STRASBOURG CEDEX 88. 37. 32. 18
Bas-Rhin: 88.69.65.89 - Haut-Rhin: 89.72.49.70



** COLZA **

----GROSSES ALTISES

* SITUATION:

Le vol des Grosses Altises étant considérablement réduit depuis le début du mois, les captures en cuvettes jaunes sont très rares. De nombreuses cultures ont dépassé la période de sensibilité aux morsures (stade B2).

* PRECONISATION:

Le risque de dégâts est faible. Reportez-vous au bulletin précédent afin d'éviter les interventions inutiles. Mais attention, continuez à surveiller vos cuvettes jaunes. Les pontes déposées à l'automne pourraient avoir de facheuses conséquences en fin d'hiver.

----CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

* SITUATION:

Les toutes premières captures de Charançon du bourgeon terminal sont enregistrées dans les secteurs de Rouffach et Cernay.

* PRECONISATION:

Un traitement pourrait être nécessaire peu après la Toussaint pour détruire les adultes avant le dépôt des pontes dans les pétioles. Consultez le prochain bulletin.

----LIMACES ET NOCTUELLES

Restez vigilants face aux attaques éventuelles.